

**SD-Mix****8-25-5 + TE**

HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                                     | % (W/W) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Toplam Azot (N)                                                                           | % 8     |
| Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )                                                            | % 8     |
| Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | % 25    |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )                           | % 25    |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)                                            | % 5     |
| Suda Çözünür Bor (B)                                                                      | % 1     |
| Suda Çözünür Bakır (Cu)                                                                   | % 0,5   |
| Suda Çözünür Demir (Fe)                                                                   | % 2     |
| Suda Çözünür Mangan (Mn)                                                                  | % 2     |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)                                                                   | % 4     |

## UYGULAMA MİKTARI

| BİTKİLER                                                                                                                                       | KULLANIM ZAMANI        | TOPRAKTAN       | YAPRAKTAN        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler<br>(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz vb.)                                      | Gelişme dönemi boyunca | 1 – 1,5 kg / da | 300 – 500 g / da |
| Yapraklı Yenen Kışık Sebzeler<br>(Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak)                                                                            |                        | 1 – 1,5 kg / da | 300 – 500 g / da |
| Yumrulu Bitkiler<br>(Patates, Soğan, Havuç, Turp)                                                                                              |                        | 1 – 1,5 kg / da | 300 – 500 g / da |
| Tüm Meyve Ağaçları<br>(Turuncgiller, Elma, Kiraz, Muz, Kivi, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Ayva, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) |                        | 1 – 1,5 kg / da | 300 – 500 g / da |
| Endüstri Bitkileri<br>(Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Ayçiçeği, Yer Fıstığı)                                                                      |                        | 1 – 1,5 kg / da | 300 – 500 g / da |
| Tüm Baklagiller<br>(Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Bezelye, Yonca vb.)                                                                        |                        | 1 – 1,5 kg / da | 300 – 500 g / da |
| Tahıllar<br>(Buğday, Arpa, Çeltik, vb.)                                                                                                        |                        | 1 – 1,5 kg / da | 300 – 500 g / da |
| Daha geniş bilgi için bayınız veya firma yetkilisine başvurunuz.                                                                               |                        |                 |                  |

**Juwa****8-53-8 + TE**

HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                                     | % (W/W) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Toplam Azot (N)                                                                           | % 8     |
| Amonyum Azotu (N-NH <sub>4</sub> )                                                        | % 8     |
| Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | % 53    |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )                           | % 53    |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)                                            | % 8     |
| Suda Çözünür Bor (B)                                                                      | % 0,5   |

## UYGULAMA MİKTARI

| BİTKİLER                                                                                                                                       | KULLANIM ZAMANI        | TOPRAKTAN     | YAPRAKTAN        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler<br>(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz vb.)                                      | Gelişme dönemi boyunca | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Yapraklı Yenen Kışık Sebzeler<br>(Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak)                                                                            |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Yumrulu Bitkiler<br>(Patates, Soğan, Havuç, Turp)                                                                                              |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Tüm Meyve Ağaçları<br>(Turuncgiller, Elma, Kiraz, Muz, Kivi, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Ayva, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Endüstri Bitkileri<br>(Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Ayçiçeği, Yer Fıstığı)                                                                      |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Tüm Baklagiller<br>(Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Bezelye, Yonca vb.)                                                                        |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Tahıllar<br>(Buğday, Arpa, Çeltik, vb.)                                                                                                        |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Daha geniş bilgi için bayınız veya firma yetkilisine başvurunuz.                                                                               |                        |               |                  |

**Nutrisima****12-6-34**

HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                                     | % (W/W) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Toplam Azot (N)                                                                           | % 12    |
| Nitrat Azotu (N-NO <sub>3</sub> )                                                         | % 9,7   |
| Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )                                                            | % 2,3   |
| Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | % 6     |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )                           | % 6     |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)                                            | % 34    |

## UYGULAMA MİKTARI

| BİTKİLER                                                                                                                                       | KULLANIM ZAMANI        | TOPRAKTAN     | YAPRAKTAN        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler<br>(Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz vb.)                                      | Gelişme dönemi boyunca | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Yapraklı Yenen Kışık Sebzeler<br>(Kıvıroik, Marul, Lahana, Ispanak)                                                                            |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Yumrulu Bitkiler<br>(Patates, Soğan, Havuç, Turp)                                                                                              |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Tüm Meyve Ağaçları<br>(Turuncgiller, Elma, Kiraz, Muz, Kivi, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Ayva, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Endüstri Bitkileri<br>(Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Ayçiçeği, Yer Fıstığı)                                                                      |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Tüm Baklagiller<br>(Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Bezelye, Yonca vb.)                                                                        |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Tahıllar<br>(Buğday, Arpa, Çeltik, vb.)                                                                                                        |                        | 2 – 4 kg / da | 200 – 400 g / da |
| Daha geniş bilgi için bayınız veya firma yetkilisine başvurunuz.                                                                               |                        |               |                  |

Her damlada

kalite...

SULAMA DÜNYASI TARIM  
SULAMA SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.Merkez Adresi:  
Fevzi Çakmak Mah. 10484 Sok. No: 7  
Karatay / KONYAFabrika Adresi:  
Fevzi Çakmak Mah. 10753 Sok. No: 30/A  
Karatay / KONYA+90 (332) 342 70 76  
info@sulamadunyasi.com.tr



## Duppin-N

**(15-0-0)**  
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK          | % (W/W) |
|--------------------------------|---------|
| Toplam Azot (N)                | % 15    |
| Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> ) | % 15    |



## Juwa-NPZn

**5-20-0 + TE**  
NP'Lİ GÜBRE ÇÖZELTİSİ

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                           | % (W/W) |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Toplam Azot (N)                                                 | % 5     |
| Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )                                  | % 5     |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | % 20    |
| Suda Çözünür Bor (B)                                            | % 0,03  |
| Suda Çözünür Bakır (Cu)                                         | % 0,03  |
| Suda Çözünür Demir (Fe)                                         | % 0,3   |
| Suda Çözünür Mangan (Mn)                                        | % 0,3   |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)                                         | % 3     |



## SD Nitroliq

**24-0-0 + TE**  
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK              | % (W/W) |
|------------------------------------|---------|
| Toplam Azot (N)                    | % 24    |
| Amonyum Azotu (NH <sub>4</sub> -N) | % 6     |
| Nitrat Azotu (N-NO <sub>3</sub> )  | % 6     |
| Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )     | % 12    |
| Suda Çözünür Bor (B)               | % 0,1   |
| Suda Çözünür Demir (Fe)            | % 0,4   |
| Suda Çözünür Mangan (Mn)           | % 0,2   |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)            | % 0,3   |

| UYGULAMA MİKTARI                                                                                                                            |                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| BİTKİLER                                                                                                                                    | KULLANIM ZAMANI        | TOPRAKTAN                           |
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz vb.)                                      | Gelişme dönemi boyunca | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Yaprağı Yenen Kışık Sebzeler (Kıvrıkcık, Marul, Lahana, Ispanak)                                                                            |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Havuç, Turp)                                                                                              |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Tüm Meyve Ağaçları (Turuncgiller, Elma, Kiraz, Muz, Kivi, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Ayva, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Ayçiçeği, Yer Fıstığı)                                                                      |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Bezelye, Yonca vb.)                                                                        |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.)                                                                                                        |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Daha geniş bilgi için bayiniz veya firma yetkilisine başvurunuz.                                                                            |                        |                                     |



## Duppin-NP

**(3-15-0)**  
NP'Lİ GÜBRE ÇÖZELTİSİ

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                            | % (W/W) |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Toplam Azot (N)                                                  | % 3     |
| Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )                                   | % 3     |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | % 15    |



## Nutrisima-Likid

**3-0-21**  
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK                          | % (W/W) |
|------------------------------------------------|---------|
| Toplam Azot (N)                                | % 3     |
| Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )                 | % 3     |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | % 21    |

| UYGULAMA MİKTARI                                                                                                                            |                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| BİTKİLER                                                                                                                                    | KULLANIM ZAMANI        | TOPRAKTAN                           |
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz vb.)                                      | Gelişme dönemi boyunca | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Yaprağı Yenen Kışık Sebzeler (Kıvrıkcık, Marul, Lahana, Ispanak)                                                                            |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Havuç, Turp)                                                                                              |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Tüm Meyve Ağaçları (Turuncgiller, Elma, Kiraz, Muz, Kivi, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Ayva, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Ayçiçeği, Yer Fıstığı)                                                                      |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Bezelye, Yonca vb.)                                                                        |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.)                                                                                                        |                        | 1 – 2 L / da<br>(1,2 – 2,4 kg / da) |
| Daha geniş bilgi için bayiniz veya firma yetkilisine başvurunuz.                                                                            |                        |                                     |

| UYGULAMA MİKTARI                                                                                                                            |                                                                        |                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| BİTKİLER                                                                                                                                    | KULLANIM ZAMANI                                                        | YAPRAKTAN                          | TOPRAKTAN                |
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz vb.)                                      | Çiçeklenme öncesi ve çiçek döneminde                                   | 100 – 150 ml<br>(125-187,5 g) / da | 1-2 L (1,25-2,5 kg) / da |
| Yaprağı Yenen Kışık Sebzeler (Kıvrıkcık, Marul, Lahana, Ispanak)                                                                            | 4-6 yaprak döneminde ve çiçeklenme başlangıcında                       | 100 – 150 ml<br>(125-187,5 g) / da | 1-2 L (1,25-2,5 kg) / da |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Havuç, Turp)                                                                                              | 4-8 yaprak döneminde                                                   | 100 – 150 ml<br>(125-187,5 g) / da | 1-2 L (1,25-2,5 kg) / da |
| Tüm Meyve Ağaçları (Turuncgiller, Elma, Kiraz, Muz, Kivi, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Ayva, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) | 5-15 cm'lik dönemde 10-15 gün arayla 2 uygulama                        | 100 – 150 ml<br>(125-187,5 g) / da | 1-2 L (1,25-2,5 kg) / da |
| Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Ayçiçeği, Yer Fıstığı)                                                                      | 6-8 yaprak döneminde Şekerpancarında sıra örtülünceye kadar 2 uygulama | 100 – 150 ml<br>(125-187,5 g) / da | 1-2 L (1,25-2,5 kg) / da |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Bezelye, Yonca vb.)                                                                        | Çiçeklenme öncesi, çiçek dönemi ve yeni gelişme döneminde              | 100 – 150 ml<br>(125-187,5 g) / da | 1-2 L (1,25-2,5 kg) / da |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.)                                                                                                        | Çiçeklenme başlangıcı ve çiçek döneminde                               | 100 – 150 ml<br>(125-187,5 g) / da | 1-2 L (1,25-2,5 kg) / da |
| Daha geniş bilgi için bayiniz veya firma yetkilisine başvurunuz.                                                                            |                                                                        |                                    |                          |

| UYGULAMA MİKTARI                                                                                                                            |                                                                        |                                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| BİTKİLER                                                                                                                                    | KULLANIM ZAMANI                                                        | YAPRAKTAN                        | TOPRAKTAN              |
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz vb.)                                      | Çiçeklenme öncesi ve çiçek döneminde                                   | 300 – 400 ml<br>(375-500 g) / da | 3-4 L (3,75-5 kg) / da |
| Yaprağı Yenen Kışık Sebzeler (Kıvrıkcık, Marul, Lahana, Ispanak)                                                                            | 4-6 yaprak döneminde ve çiçeklenme başlangıcında                       | 300 – 400 ml<br>(375-500 g) / da | 3-4 L (3,75-5 kg) / da |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Havuç, Turp)                                                                                              | 4-8 yaprak döneminde                                                   | 300 – 400 ml<br>(375-500 g) / da | 3-4 L (3,75-5 kg) / da |
| Tüm Meyve Ağaçları (Turuncgiller, Elma, Kiraz, Muz, Kivi, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Ayva, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) | 5-15 cm'lik dönemde 10-15 gün arayla 2 uygulama                        | 300 – 400 ml<br>(375-500 g) / da | 3-4 L (3,75-5 kg) / da |
| Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Ayçiçeği, Yer Fıstığı)                                                                      | 6-8 yaprak döneminde Şekerpancarında sıra örtülünceye kadar 2 uygulama | 300 – 400 ml<br>(375-500 g) / da | 3-4 L (3,75-5 kg) / da |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Bezelye, Yonca vb.)                                                                        | Çiçeklenme öncesi, çiçek dönemi ve yeni gelişme döneminde              | 300 – 400 ml<br>(375-500 g) / da | 3-4 L (3,75-5 kg) / da |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.)                                                                                                        | Çiçeklenme başlangıcı ve çiçek döneminde                               | 300 – 400 ml<br>(375-500 g) / da | 3-4 L (3,75-5 kg) / da |
| Daha geniş bilgi için bayiniz veya firma yetkilisine başvurunuz.                                                                            |                                                                        |                                  |                        |



## SD Trace Mix

DEMİR (Demir Sülfat), ÇİNKO (Çinko Sülfat), MANGAN (Mangan Sülfat) SIVI MİKRO BESİN ELEMENTLERİ KARIŞIMI

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK    | % (W/W) |
|--------------------------|---------|
| Suda Çözünür Demir (Fe)  | % 5,8   |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,7   |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)  | % 0,6   |

| UYGULAMA MİKTARI                                                                                                                            |                                                                        |                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| BİTKİLER                                                                                                                                    | KULLANIM ZAMANI                                                        | YAPRAKTAN                      | TOPRAKTAN                           |
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz vb.)                                      | Çiçeklenme öncesi ve çiçek döneminde                                   | 75 – 125 ml<br>(90-150 g) / da | 0,5 – 0,75 L<br>(0,6 – 0,9 kg) / da |
| Yaprağı Yenen Kışık Sebzeler (Kıvrıkcık, Marul, Lahana, Ispanak)                                                                            | 4-6 yaprak döneminde ve çiçeklenme başlangıcında                       | 75 – 125 ml<br>(90-150 g) / da | 0,5 – 0,75 L<br>(0,6 – 0,9 kg) / da |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Havuç, Turp)                                                                                              | 4-8 yaprak döneminde                                                   | 75 – 125 ml<br>(90-150 g) / da | 0,5 – 0,75 L<br>(0,6 – 0,9 kg) / da |
| Tüm Meyve Ağaçları (Turuncgiller, Elma, Kiraz, Muz, Kivi, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Ayva, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) | 5-15 cm'lik dönemde 10-15 gün arayla 2 uygulama                        | 75 – 125 ml<br>(90-150 g) / da | 0,5 – 0,75 L<br>(0,6 – 0,9 kg) / da |
| Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Ayçiçeği, Yer Fıstığı)                                                                      | 6-8 yaprak döneminde Şekerpancarında sıra örtülünceye kadar 2 uygulama | 75 – 125 ml<br>(90-150 g) / da | 0,5 – 0,75 L<br>(0,6 – 0,9 kg) / da |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Bezelye, Yonca vb.)                                                                        | Çiçeklenme öncesi, çiçek dönemi ve yeni gelişme döneminde              | 75 – 125 ml<br>(90-150 g) / da | 0,5 – 0,75 L<br>(0,6 – 0,9 kg) / da |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.)                                                                                                        | Çiçeklenme başlangıcı ve çiçek döneminde                               | 75 – 125 ml<br>(90-150 g) / da | 0,5 – 0,75 L<br>(0,6 – 0,9 kg) / da |
| Daha geniş bilgi için bayiniz veya firma yetkilisine başvurunuz.                                                                            |                                                                        |                                |                                     |